

劇 動物用医薬品

馬用駆虫剤



### 成分及び分量

100g 中

イベルメクチン……………1.87g

本剤は白色の均一なペースト剤である。

### 効能又は効果

馬:大円虫、小円虫、馬回虫、馬蠅幼虫の駆除

### 用法及び用量

1 回体重 1kg 当たりイベルメクチンとして 200 μg(製品として 10.7mg)を強制的に経口投与する。

### 使用法:

容器内には 600kg の馬 1 頭分に相当する量のペーストが充填しており、内筒に付した目盛により、必要量を投与することができる。リングを 1/4 回転してゆるめ、スライドさせてリングの外筒側を投与馬の体重に相当する目盛にあわせ、1/4 逆回転して固定する。馬の口の中に飼料がないのを確認し、キャップをとり、容器を歯と歯の間(切歯と前臼歯の間)から挿入し、舌上にペーストを押し出す。投与後直ちに馬の頭を数秒間持ち上げ、確実に投与する。

### 使用上の注意

#### 【一般的注意】

- (1) 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- (2) 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (3) 馬以外の動物には投与しないこと。
- (4) 本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意:本剤は薬事法第 83 条の 4 の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた医薬品ですので、使用対象動物(馬)について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守して下さい。

馬:食用に供するためにと殺する前 21 日間

- (5) 本剤は獣医師の指導の下で使用すること。

#### 【使用者に対する注意】

- (1) 誤って薬剤を飲み込んだ場合は、本剤のパッケージを提示し、直ちに医師の診察を受けること。
- (2) 飲食又は喫煙をしながら投与しないこと。
- (3) 使用後は手を洗うこと。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は水洗いすること。

#### 【馬に対する注意】

##### 副作用

- (1) 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- (2) 本剤の投与により、後肢浮腫、また時に発疹をおこすことがある。

#### 【取扱い上の注意】

- (1) 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- (2) 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

#### 【保管上の注意】

- (1) 本剤は劇薬であるので、取扱いには十分に注意し、他の医薬品、食品、飼料等と区別し、小児の手の届かないところに保管すること。
- (2) 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。

**包装** 6.42g (ポリプロピレン容器入)

®イクイバランはメリアルの所有登録商標

製造販売元(輸入発売元)

**DS ファーマアニマルヘルス株式会社**

大阪市福島区海老江 1-5-51

提携

**メリアル・ジャパン株式会社**

東京都千代田区永田町 2-14-2



www.merial.co.jp